

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

APPORRE QUI IL
CODICE A BARRE

ETICHETTA
CANDIDATO

PROVA PRATICA N. **3**

1) Il candidato annerisca completamente la casella della risposta contenente quelli che tra i seguenti sono **"i due comportamenti scorretti"** nella procedura di igiene del cavo orale:

- A. Preparare l'attrezzatura: guanti monouso, spazzolino morbido o scovolino in gommapiuma, dentifricio, collutorio, garze, abbassalingua, contenitore per acqua, traversa monouso e salviette
- B. Posizionare il paziente aiutandolo ad assumere una posizione supina.
- C. Lavare le mani e quando sono ancora bagnate, indossare i guanti sterili.
- D. Se il paziente non ha denti o porta la dentiera che va rimossa, usare uno scovolino morbido, imbevuto di acqua o collutorio per pulire le gengive, lingua e palato
- E. Incoraggiare il paziente a sciacquare il cavo orale con una soluzione di acqua e collutorio. Aiutare la persona ad asciugare la bocca e idratare le labbra con prodotto specifico.

☐ A - B

☒ B - C

☐ B - E

☐ C - D

2) Il candidato annerisca completamente la casella della risposta contenente quelli che tra i seguenti sono **"i due comportamenti scorretti"** in caso di cure igieniche in bagno:

- A. Far alzare il paziente ed accompagnarlo in bagno dopo aver controllato il microclima.
- B. Sostituirsi completamente al paziente, anche se parzialmente autosufficiente.
- C. Segnalare all'infermiere eventuali alterazioni della cute e le modifiche riguardo al grado di autonomia.
- D. Riportare a letto il paziente ancora bagnato.
- E. Riordinare il locale dopo la procedura

☐ A - B

☐ B - C

☐ A - E

☒ B - D

3) Il candidato annerisca completamente la casella della risposta contenente quelli che tra i seguenti sono **"i due comportamenti corretti"** nella procedura di rilevazione della pressione arteriosa

- A. Identificare e garantire la privacy del paziente
- B. Applicare il manicotto dello sfigmomanometro e posizionare correttamente il fonendoscopio
- C. Misurare sempre la pressione, dopo aver fatto salire al paziente 4 piani di scale.
- D. Gonfiare e sgonfiare sempre il manicotto per almeno 5 volte, effettuando la lettura della pressione massima e minima e facendo la media dei valori
- E. Rimuovere il manicotto e non registrare i valori perché si tengono a memoria.

☒ A - B

☐ C - E

☐ B - E

☐ C - D