

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO
(A.P.S.F. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE)

PROVA SCRITTA **A**

1. Secondo il decalogo UNICEF-OMS per l'avvio efficace dell'allattamento al seno:

- A. È necessario facilitare e porre a contatto pelle a pelle madre-neonato dopo un'ora dalla nascita
- B. È necessario facilitare e porre a contatto pelle a pelle madre-neonato immediatamente dopo la nascita
- C. Non è necessario facilitare e porre a contatto pelle a pelle madre-neonato dopo la nascita

2. Nella paracentesi a scopo diagnostico viene prelevato un campione di:

- A. liquido cerebro-spinale
- B. liquido ascitico
- C. liquido sinoviale

3. A tutti i neonati alla nascita viene somministrata la:

- A. Vitamina A
- B. Vitamina C
- C. Vitamina K

4. Il morbo di Hirschsprung è:

- A. Una cardiopatia congenita
- B. Una malattia respiratoria rara del bambino
- C. Una malattia congenita del colon che colpisce circa 1:5000 bambini

5. Qual è il metodo corretto per misurare la lunghezza del sondino nasogastrico ai fini del posizionamento:

- A. misurare dalla rima labiale al processo xifoideo
- B. misurare la distanza tra punta del naso e il lobo auricolare; poi da questo punto fino al processo xifoideo
- C. misurare dalla narice scelta per il posizionamento al processo xifoideo

6. Le cause più frequenti di disidratazione del bambino piccolo sono:

- A. le ustioni
- B. le emorragie
- C. il vomito e la diarrea

7. Un'ustione di terzo grado presenta:

- A. escara, ustione profonda del derma fino ai tessuti sottostanti
- B. flittene, ustione media con coinvolgimento del derma papillare
- C. eritema, ustione superficiale con coinvolgimento dell'epidermide

8. Quale dei seguenti parametri non viene preso in considerazione nell'attribuzione del punteggio di Apgar?

- A. colorito cutaneo
- B. riflesso pupillare
- C. tono muscolare

9. Individuare il materiale NON necessario per l'intubazione endotracheale:

- A. laringoscopio con lame rette e/o curve di diverse misure
- B. soluzione fisiologica
- C. pinza di Magill di misura appropriata

- 10. Quale tra le seguenti cause è la più comunemente associata a bronchiolite nei bambini di età inferiore a 2 anni?**
A. Virus respiratorio sinciziale (RSV)
B. Candida Albicans
C. Toxoplasmosi
- 11. II credito formativo ECM indica:**
A. il tempo e l'impegno dedicato annualmente all'aggiornamento professionale
B. il tempo dedicato dall'azienda per la preparazione degli eventi formative
C. i costi sostenuti dall'azienda per la formazione dei professionisti
- 12. Nella celiachia bisogna eliminare dalla dieta:**
A. gli amidi
B. il glutine
C. le proteine del latte vaccino
- 13. Quale gruppo sanguigno viene definito "donatore universale":**
A. 0 negativo
B. A negativo
C. B negativo
- 14. Quale patologia si può definire come "anomalo restringimento del prepuzio in maniera tale che non possa essere ben retratto":**
A. fimosi
B. ipospadia
C. criptorchidismo
- 15. Qual è il segno più comune di disidratazione nel neonato?**
A. lacrimazione aumentata
B. fontanella anteriore leggermente depressa
C. riflessi vivaci
- 16. Quale scala permette l'autovalutazione del dolore, da parte del paziente in età pediatrica, attraverso un numero da 0 a 10:**
A. VAS
B. FLACC
C. NRS
- 17. Se vengono prescritti dal pediatra 100 mg di sciroppo antibiotico ogni 8 ore e la formulazione disponibile è di 62.5 mg/5 ml. Quanti ml di sciroppo dovranno essere somministrati ogni 8 ore?**
A. 8 ml
B. 5 ml
C. 4 ml
- 18. Qual è il significato del termine epistassi:**
A. perdita dell'equilibrio
B. emorragia nasale
C. disturbo della parola
- 19. Per la determinazione della fenilchetonuria del neonato è necessario prelevare:**
A. sangue arterioso
B. sangue capillare
C. urina
- 20. Le complicanze più frequenti dell'ipertensione nel bambino piccolo sono le:**
A. epilessie
B. convulsioni
C. encefaliti