

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO
(A.P.S.F. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE)

PROVA SCRITTA **B**

- 1. Secondo i 10 passi UNICEF-OMS per il successo dell'allattamento è necessario:**
 - A. Incoraggiare la madre ad allattare ad orari fissi per essere certa che il neonato si alimenti
 - B. Incoraggiare la madre all'allattamento al seno a richiesta tutte le volte che il neonato sollecita nutrimento
 - C. Incoraggiare la madre a riposare nelle ore notturne, per recuperare le energie lasciando il neonato alle cure del personale
- 2. Quale modalità di assunzione del farmaco garantisce un assorbimento più rapido:**
 - A. sottocutanea
 - B. sublinguale
 - C. orale
- 3. Qual è il sintomo caratteristico di un bambino con stenosi ipertrofica del piloro?**
 - A. Diarrea cronica
 - B. Stipsi cronica
 - C. Vomito a getto
- 4. Che cosa è una petecchia:**
 - A. Un'eruzione cutanea maculo-papulosa
 - B. Una reazione allergica cutanea
 - C. Uno stravasamento ematico puntiforme cutaneo
- 5. Quanti crediti ECM deve acquisire nel triennio un professionista iscritto all'Ordine e appartenente ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente:**
 - A. 50 ECM
 - B. 100 ECM
 - C. 150 ECM
- 6. Quale delle seguenti è una controindicazione assoluta all'allattamento al seno?**
 - A. capezzoli rientranti
 - B. madre fumatrice di sigarette
 - C. la tubercolosi attiva della madre
- 7. Durante la terapia con oppioidi si deve valutare:**
 - A. solo il dolore
 - B. il dolore e lo stato di coscienza
 - C. il dolore, lo stato di coscienza, gli effetti collaterali
- 8. Sono stati prescritti dal medico 100 mg di Fenobarbitale e la confezione disponibile contiene fiale da 200mg/5ml. Quanti ml prelevi dalla fiala?**
 - A. 2.5 ml
 - B. 25 ml
 - C. 5 ml

- 9. Durante una trasfusione di emazie, il bambino manifesta brividi, cefalea e sensazione di calore. Cosa è necessario effettuare velocemente?**
- A. sospendere la trasfusione, rimuovere l'accesso venoso ed informare il medico
 - B. sospendere la trasfusione, mantenere l'accesso venoso con soluzione fisiologica ed informare il medico
 - C. sospendere la trasfusione, rimuovere l'accesso venoso e segnalare il fatto in cartella infermieristica
- 10. Quale delle seguenti rappresenta una controindicazione alla somministrazione della terapia rettale?**
- A. diarrea
 - B. nausea
 - C. vomito
- 11. Quali parametri vengono valutati nel neonato per stabilire l'indice di Apgar:**
- A. colorito cutaneo – attività cardiaca – attività respiratoria – pressione arteriosa – tono muscolare
 - B. colorito cutaneo - temperatura corporea - attività cardiaca - attività respiratoria - tono muscolare
 - C. colorito cutaneo - attività cardiaca - tono muscolare - attività respiratoria - eccitabilità dei riflessi
- 12. Un neonato sottoposto a fototerapia deve essere:**
- A. vestito con protezione sugli occhi
 - B. nudo senza protezione sugli occhi
 - C. nudo con protezione sugli occhi
- 13. Cosa si intende per ematemesi:**
- A. emissione di sangue dal naso
 - B. emissione di sangue con il vomito
 - C. emissione di sangue con le feci
- 14. A chi viene praticata la profilassi antiemorragica alla nascita?**
- A. a tutti i neonati affetti da deficit della coagulazione
 - B. a tutti i neonati entro poche ore dalla nascita
 - C. a tutti i neonati nati da madre affetta da patologia della coagulazione
- 15. La modalità di prima scelta, per la raccolta delle urine in età pediatrica, per l'urinocoltura è:**
- A. puntura sovra pubica
 - B. sacchetto delle urine
 - C. mitto intermedio
- 16. Quale tra le seguenti scale risulta più appropriata per la valutazione del dolore in un bambino di 3 anni che non è ancora in grado di esprimere un valore numerico?**
- A. scala VAS
 - B. scala NRS
 - C. scala FLACC
- 17. L'uso dei guanti sostituisce l'igiene delle mani?**
- A. Sì
 - B. no
 - C. sì e si possono igienizzare i guanti stessi senza sostituirli per tutta la giornata lavorativa
- 18. La pinza di Magill serve a:**
- A. rimuovere la cannula di Mayo
 - B. guidare il tubo endotracheale fra le corde vocali
 - C. arrestare un'emorragia della faringe
- 19. L'indice di massa corporea consente di identificare il rischio di:**
- A. caduta
 - B. obesità
 - C. lesioni da pressione
- 20. La somministrazione di farmaci per via enterale avviene attraverso il:**
- A. sistema circolatorio
 - B. tratto gastro-intestinale
 - C. sistema cutaneo e sottocutaneo