

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO
(A.P.S.F. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE)

PROVA SCRITTA C

1. Secondo i 10 passi UNICEF-OMS per il successo dell'allattamento è necessario che:

- A. madre e neonato siano ospitati in reparti diversi, per una migliore assistenza ed osservazione delle loro condizioni e si incontrino per le poppate agli orari previsti nelle 24 ore
- B. madre e neonato siano nella stessa stanza, affinché possano trascorrere 24h/24h insieme, dando modo alla madre di accorgersi delle esigenze del neonato e rispondere con più facilità ai suoi segnali di fame.
- C. madre e neonato trascorran la giornata insieme e riposino nelle ore notturne in spazi o reparti diversi, per consentire il riposo materno e l'osservazione continua del neonato.

2. Il cordone ombelicale è composto:

- A. da 1 vena e 1 arteria
- B. da 2 arterie e 1 vena
- C. da 2 vene e 1 arteria

3. Nell'atresia delle vie biliari le feci del bambino sono:

- A. picee
- B. steatosiche
- C. biancastre

4. In caso di emorragia acuta il bambino presenterà:

- A. pallore, agitazione, pa aumentata, fc aumentata, estremità degli arti fredde
- B. pallore, agitazione, pa aumentata, fc diminuita, estremità degli arti fredde
- C. pallore, agitazione, pa diminuita, fc aumentata, estremità degli arti fredde

5. Quale delle seguenti affermazioni sulla profilassi peri-operatoria è corretta:

- A. deve essere di durata non inferiore a 5 giorni
- B. viene somministrata in monodose all'induzione dell'anestesia
- C. consiste nella somministrazione di un antibiotico a lento assorbimento

6. I sintomi più frequenti nella sindrome da astinenza del neonato sono:

- A. tremori, irritabilità
- B. pianto persistente, ipertono
- C. tutte le precedenti

7. Cosa si intende per somministrazione intratecale:

- A. somministrazione di farmaci a livello scapolo-omeroale
- B. somministrazione di farmaci a livello del rachide
- C. somministrazione di farmaci nello spazio subaracnoideo

8. Il catetere venoso ombelicale è:

- A. un catetere venoso periferico
- B. un catetere venoso centrale
- C. un PICC

9. Cosa si intende per bilancio idrico:

- A. determinazione e registrazione delle entrate dei liquidi nelle 24 ore
- B. determinazione e registrazione delle entrate e delle uscite nelle 24 ore
- C. determinazione e registrazione delle uscite dei liquidi nelle 24 ore

10. La complicanza più frequente della diarrea acuta è:

- A. anemia
- B. dispnea
- C. disidratazione

11. Quale delle seguenti scale di valutazione del dolore risulta maggiormente indicata in Terapia Intensiva Neonatale?

- A. FLACC
- B. PIPP
- C. VAS

12. La manovra di Heimlich si usa:

- A. nell'ostruzione delle vie aeree
- B. nell'intubazione oro-tracheale
- C. nella rianimazione cardiorespiratoria

13. Quale Gruppo sanguigno viene definito "ricevente universale":

- A. ab positivo
- B. a positivo
- C. b positivo

14. Se il pediatra prescrive 125 mg di Ampicillina e sono disponibili fiale da 1 g in 4 ml di solvente. Quanti ml di antibiotico dovranno essere somministrati?

- A. 2 ml
- B. 1 ml
- C. 0.5 ml

15. Chi può esprimere il Consenso Informato nel caso di un minorenne:

- A. il minore stesso
- B. i genitori o tutore
- C. qualsiasi parente adulto

16. Quali dei seguenti aghi ha il calibro maggiore:

- A. ago da 14 g
- B. ago da 18 g
- C. ago da 16 G

17. L'adesione al Programma Nazionale di Educazione Continua in medicina:

- A. è obbligatoria per tutte le figure professionali appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente, per le quali è obbligatoria l'iscrizione all'ordine
- B. è volontaria
- C. riguarda solo i liberi professionisti

18. Nei neonati pretermine, la malattia delle membrane ialine polmonari, riconosce come fattore eziopatogenetico più importante:

- A. deficit numerico di pneumotici di tipo I
- B. carenza di surfattante
- C. nessuna delle precedenti

19. L'agente responsabile della mononucleosi è:

- A. Zoster virus
- B. Epstein-Barr virus
- C. Papilloma virus

20. Il termine Triage indica una procedura finalizzata a:

- A. dare soccorso al maggior numero di persone contemporaneamente
- B. valutare la gravità delle lesioni di un singolo individuo
- C. valutare le priorità assistenziali attraverso la valutazione della condizione clinica dei pazienti e del loro rischio evolutivo