Gentile Signora/e,

Per eseguire una procedura endoscopica del tratto digestivo superiore è fondamentale una corretta preparazione.
Qui di seguito troverà la preparazione specifica per l'esame che dovrà eseguire, dopo aver individuato la procedura che dovrà eseguire (verifichi la prescrizione medica/foglio di prenotazione) segua attentamente le indicazioni prescritte per la corretta preparazione.

IL GIORNO DELLA PROCEDURA: Venga accompagnato, porti con sé tutti i documenti relativi a ricoveri, interventi chirurgici, esami ematochimici, esami endoscopici e radiologici precedenti.
Le verranno chieste informazioni relative a terapie precedenti ed in corso.
Ci segnali eventuali sue allergie a farmaci, se portatore di pacemaker, o se affetto da glaucoma.
È preferibile indossare abbigliamento comodo, rimuovere protesi mobili e oggetti metallici (collane, bracciali, orecchini, anelli e orologio etc.).

TERMINATA LA PROCEDURA Rimarrà presso la SC di Endoscopia fino a completa ripresa della lucidità.
Le procedure endoscopiche vengono eseguite in sedazione, per il ritorno a casa è **obbligatorio essere accompagnati da persona adulta e responsabile**.
Per il resto della giornata non dovrà guidare la macchina, lavorare su macchinari o prendere decisioni importanti, dal momento che l'effetto tardivo dei sedativi può rallentare i riflessi e ridurre la Sua capacita di giudizio.

PAZIENTI IN TERAPIA CON FARMACI ANTICOAGULANTI O ANTIAGGREGANTI:
Si consiglia la sospensione della terapia anticoagualnte\antiaggregante nell'eventualità che la procedura diventi operativa (es.rimozione di polipi), tuttavia è consigliabile consultare il medico curante e/o il prescrittore per stabilire opportunità, modalità e la durata di sospensione della terapia.

PREPARAZIONE DA ESEGUIRE NEL CASO DI ESECUZIONE DI

❖ ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA

La sera prima della procedura:
E' ammessa una cena leggera entro le ore 20.00 poi digiuno assoluto dai cibi solidi.
Il giorno della procedura:
Digiuno dai cibi solidi.

È ammesso bere liquidi chiari (acqua, the o tisane) e assumere terapia orale sino a 2 ore prima della procedura.
Non assumere alcun cibo solido dall'inizio del ciclo di trattamento e fino al termine dell'esame clinico.

❖ ECOENDOSCOPIA DELPANCREAS & ECOENDOSCOPIA SUPERIORE (EUS)

La sera prima della procedura:
E' ammessa una cena leggera entro le ore 20.00 poi digiuno assoluto dai cibi solidi.

Il giorno della procedura:
Digiuno dai cibi solidi.

È ammesso bere liquidi chiari (acqua, the o tisane) e assumere terapia orale sino a 2 ore prima della procedura.
Non assumere alcun cibo solido dall'inizio del ciclo di trattamento e fino al termine dell'esame clinico.

❖ ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA (VCE)

Indispensabile sospendere i medicinali a base di ferro 7 giorni prima dell'indagine
Controindicazioni: stenosi a livello gastrointestinale, gravidanza, disturbi della deglutizione e della motilità gastrointestinale.
Pacemaker, defibrillatore o altro dispositivo cardiaco impiantabile: indispensabile il parere favorevole scritto del cardiologo.
Pazienti sottoposti a interventi di resezione gastrointestinale: contattare il servizio di endoscopia 0392333407

PREPARAZIONE INTESTINALE Acquistare uno dei seguenti prodotti in farmacia e seguire le istruzioni

- PLENVU® (1 LITRO) - **Controindicato in caso di fenilchetonuria e favismo**

Il giorno prima della procedura:
Si può consumare una leggera colazione seguita da un pranzo leggero (pastina in brodo o yogurt magro senza frutta) da completarsi entro le ore 14.00
Alle ore 19.00 sciogliere la **DOSE 1 (1busta) in ½ Litro di acqua** e bere LENTAMENTE e a piccoli sorsi in 30-40 minuti (meglio fresca, messa in frigorifero dopo completo scioglimento). Nei 30 minuti successivi bere almeno un altro ½ Litro di liquidi chiari (es. acqua, tè, camomilla).
Il giorno della procedura:
Digiuno da cibi solidi (non è ammessa la colazione), **4 ore prima della procedura**, sciogliere la **DOSE 2 (busta A+ busta B) in ½ Litro di acqua** e bere LENTAMENTE e a piccoli sorsi in 30-40 minuti (meglio fresca messa in frigorifero dopo completo scioglimento). Nei 30 minuti successivi bere almeno un altro ½ Litro di liquidi chiari (es. acqua, tè, camomilla).

In caso di difficoltà (nausea) si consiglia di rallentarne l'assunzione;
E' consigliato bere la preparazione con l'aiuto di una cannuccia ed intervallare l'assunzione della soluzione ricostruita con i liquidi chiari.

E' ammesso bere liquidi chiari (acqua, the o tisane) e assumere terapia orale sino a 2 ore prima della procedura.
Non assumere alcun cibo solido dall'inizio del ciclo di trattamento e fino al termine dell'esame clinico.

- CLENSIA® (2LITRI)

Il giorno prima della procedura:
Si può consumare una leggera colazione seguita da un pranzo leggero (pastina in brodo o yogurt magro senza frutta) da completarsi entro le ore 14.00
Alle ore 19.00 sciogliere **2 bustine A** e **2 bustine B** in **1 Litro di acqua** e berne 250 ml ogni 15 minuti, successivi bere almeno un altro ½ Litro di liquidi chiari (es. acqua, tè, camomilla).

Il giorno della procedura:
Digiuno da cibi solidi (non è ammessa la colazione), **4 ore prima dalla procedura,** sciogliere **2 bustine A** e **2 bustine B** in **1 Litro di acqua** e berne 250 ml ogni 15 minuti, successivi bere almeno un altro ½ Litro di liquidi chiari (es. acqua, tè, camomilla).

E' ammesso bere liquidi chiari (acqua, the o tisane) e assumere terapia orale sino a 2 ore prima della procedura.
Non assumere alcun cibo solido dall'inizio del ciclo di trattamento e fino al termine dell'esame clinico.

- **POLIETILENGLICOLE PEG 4000** (2 LITRI) – (per esempio. **Selge®sse o Isocolan®**)

Il giorno prima della procedura:
Si può consumare una leggera colazione seguita da un pranzo leggero (pastina in brodo o yogurt magro senza frutta) da completarsi entro le ore 14.00
Dalle ore 19.00 bere i 2 litri di soluzione, 250 ml ogni 15 minuti.
Il giorno della procedura:
Digiuno da cibi solidi

È ammesso bere liquidi chiari (acqua, the o tisane) e assumere terapia orale sino a 2 ore prima della procedura.
Non assumere alcun cibo solido dall'inizio del ciclo di trattamento e fino al termine dell'esame clinico.

❖ ENTEROSCOPIA PER VIA ANTEROGRADA CON DOPPIO PALLONE (DBE)

La sera prima della procedura:
E' ammessa una cena leggera entro le ore 20.00 poi digiuno assoluto dai cibi solidi.
Il giorno della procedura:
Digiuno dai cibi solidi.

È ammesso bere liquidi chiari (acqua, the o tisane) e assumere terapia orale sino a 2 ore prima della procedura.
Non assumere alcun cibo solido dall'inizio del ciclo di trattamento e fino al termine dell'esame clinico.